

## Der Absenker: Senkung der Cholesterinwerte im Anwendungstest bestätigt

### Zusammenfassung

Cholesterin ist ein lebenswichtiger Bestandteil unseres Stoffwechsels. Es wird unter anderem für die Bildung von Gallensäuren, Hormonen und den Zellmembranen benötigt. Mit zunehmendem Alter steigen die Cholesterinwerte ganz natürlich an – das ist ein normaler Prozess. Ein ausgewogener Lebensstil mit bewusster Ernährung, Bewegung und weiteren unterstützenden Maßnahmen trägt wesentlich zu einem gesunden Cholesterinspiegel bei. Zusätzlich können natürliche Stoffe mit cholesterinsenkenden Eigenschaften wie Rotschimmelreis und Bergamotte zu gesunden Blutfettwerten beitragen.

DER ABSENKER wurde von freiwilligen Testpersonen mit erhöhten Cholesterinwerten getestet (2 Kapseln täglich für 3 bis 6 Monate). Zusätzlich wurde den Teilnehmern empfohlen auf eine blutfettfreundliche Ernährung zu achten. Die Ergebnisse zeigen:

**DER ABSENKER kann als natürliche Nahrungsergänzung einen positiven Einfluss auf die Cholesterinwerte nehmen. Die Werte für LDL-Cholesterin zeigen bei 79% der Teilnehmer eine Reduktion nach 3-monatiger Einnahme von 2 Kapseln DER ABSENKER täglich.**

Der Absenker wurde in einem Anwendungstest von 24 freiwilligen Testpersonen mit erhöhten Blutfettwerten getestet. Die Probanden haben täglich 2 Kapseln (je 1 Kapsel morgens und abends) für einen Zeitraum von 3 bzw. 6 Monaten eingenommen. Zusätzlich wurde den Teilnehmern empfohlen auf eine blutfettfreundliche Kost zu achten (Ernährungsempfehlung bei erhöhten Cholesterinwerten kann im Mitgliederbereich der Website unter Ressourcen heruntergeladen werden).

### Probanden

Die Testpersonen meldeten sich freiwillig. Ausgewählt wurden Testpersonen, bei denen LDL-Werte von über 160 mg/dl im Laborbefund bestätigt wurden. 22 weibliche Probandinnen und 2 männliche Probanden im Alter von 44 – 69 Jahren haben am Anwendungstest teilgenommen.

### Testdurchführung und Auswertung

Voraussetzung für die Teilnahme am Anwendungstest war, dass die TeilnehmerInnen ein Jahr vor Start der Einnahme von DER ABSENKER keine anderen Cholesterinsenker eingenommen haben. Die Anwendung erfolgte insgesamt für 6 Monate mit 2 Kapseln DER ABSENKER täglich (je 1 Kapsel morgens und abends). Vor dem Start der Einnahme mussten die Blutfettwerte mittels Blutuntersuchung im Labor bestimmt werden = Anfangswerte. Eine weitere Bestimmung der Blutfettwerte folgte nach 3 Monaten Einnahmezeit und nochmals nach 6 Monaten ab Start der Einnahme. Eine Senkung wurde festgestellt, wenn die Werte um mehr als 9% im Vergleich zum Anfangswert gesunken sind.

### Senkung der LDL-Werte

Bei 19 von 24 Testpersonen, das sind 79% der Teilnehmer, haben sich die Werte für LDL-Cholesterin nach 3-monatiger Einnahme gesenkt (sh. Abb. 1 und Abb. 2). Die Senkung variiert in absoluten Zahlen zwischen 20 und 71 mg/dl, das entspricht einer Senkung von 12 bis 35% im Vergleich zum Ausgangswert vor der Einnahme von DER ABSENKER. In Abb. 4 werden die Werte für LDL-Cholesterin der einzelnen Teilnehmer grafisch dargestellt.




Abb. 1: Übersicht zu den Ergebnissen des Anwendungstests: **Senkung der LDL-Werte bei 79% der Teilnehmer** und Senkung der Gesamtcholesterin-Werte (LDL+HDL) bei 71% der Teilnehmer nach 3 Monaten Einnahme von je 2 Kapseln DER ABSENKER täglich.

## DR. NEUBURGER ANWENDUNGSTEST




Abb. 2: Mittlere Werte für LDL-Cholesterin im Anwendungstest am Anfang und nach 3 Monaten bzw. 6 Monaten Anwendung von DER ABSENKER

### Senkung der Gesamt-Cholesterin-Werte

Die Gesamt-Cholesterin-Werte wurden berechnet als Summenparameter von LDL- und HDL-Cholesterin. Bei 17 von 24 Testpersonen, das sind 71%, zeigt sich eine Reduktion der Gesamt-Cholesterin-Werte im Anwendungstest (sh. Abb. 1 und Abb. 3).




Abb. 3: Mittlere Werte für Gesamt-Cholesterin (LDL+HDL) im Anwendungstest am Anfang und nach 3 Monaten bzw. 6 Monaten Anwendung von DER ABSENKER

Die Senkung variiert in absoluten Zahlen zwischen 23 und 88 mg/dl, das entspricht einer Reduktion von 9 bis 28% im Vergleich zum Ausgangswert vor der Einnahme von DER ABSENKER. In Abb. 5 werden die Werte für

Gesamt-Cholesterin der einzelnen Teilnehmer grafisch dargestellt.

### Zusammenfassung der Ergebnisse

Im Anwendungstest konnte gezeigt werden, dass eine 3-monatige Einnahme von DER ABSENKER mit 2 Kapseln täglich eine Senkung der LDL-Werte bei 79% der Testpersonen bewirkte. Die maximale Senkung lag dabei bei 71 mg/dl, im Mittel zeigt sich eine Senkung von 16% im Vergleich zum Ausgangswert. Bei wenigen Personen kam es bei längerer Einnahme wieder zu einem Anstieg der Werte.

In etwa das gleiche Bild zeigt sich bei den Werten für Gesamt-Cholesterin als Summenparameter von LDL- und HDL-Cholesterin. Bei 71% der Testpersonen zeigte sich eine Senkung der Werte nach 3-monatiger Einnahme von DER ABSENKER. Die maximale Senkung lag dabei bei 88 mg/dl, im Mittel zeigt sich eine Senkung von 12% im Vergleich zum Ausgangswert. Auch hier ist bei wenigen Personen ein erneuter Anstieg der Werte bei längerer Einnahme sichtbar.

Die langjährige Praxis-Erfahrung von Dr. Christian Neuburger belegt, dass bei Menschen mit genetischer Veranlagung zu erhöhten Blutfettwerten natürliche cholesterinsenkende Maßnahmen meist nicht ausreichend sind für eine deutliche Senkung der Werte. Die Personen, bei denen sich die Werte nicht, kaum oder nur wenig gesenkt haben, bestätigen zum Teil eine solche genetische Veranlagung und erhöhte Blutfettwerte innerhalb der Familie.

### Schlussfolgerung

Eine Einnahme von DER ABSENKER (2 Kapseln täglich) kann die Werte für LDL-Cholesterin reduzieren und gemeinsam mit einer blutfettfreundlichen Kost zu gesunden Blutfettwerten beitragen.

Dr. Neuburger – die Natur kann es GmbH  
Enzing 18  
4490 St. Florian – Österreich  
[www.dr-neuburger.at](http://www.dr-neuburger.at)

Anwendungstest durchgeführt und betreut von:  
Dr. Christian Neuburger und Team

Autorin:  
Mag. rer. nat. Tina Maria Mager  
Biologin bei Dr. Neuburger

St. Florian, 15.09.2025




Abb. 4: Werte für LDL-Cholesterin im Anwendungstest bei n=24 ProbandInnen: Oranger Punkt = Anfangswert vor Start der Einnahme von DER ABSENKER. Bei 19 von 24 Testpersonen haben sich die LDL-Werte nach 3 Monaten Einnahme von DER ABSENKER gesenkt (Senkung um mehr als 9% im Vergleich zum Ausgangswert). Bei 5 Testpersonen (Nr. 7, 8, 10, 12, 18) zeigt sich nach 3-monatiger Anwendung keine deutliche Reduktion (Senkung der Werte weniger als 9% im Vergleich zum Ausgangswert). Nach 6 Monaten Einnahme zeigt sich eine deutliche Senkung bei 17 von 24 TeilnehmerInnen. Bei 7 Testpersonen (Nr. 7, 12, 17, 18, 19, 22, 23) zeigt sich keine deutliche Reduktion der Werte nach 6 Monaten Einnahme.




Abb. 5: Werte für Gesamt-Cholesterin (= Summenparameter aus LDL- und HDL-Cholesterin) im Anwendungstest bei n=24 ProbandInnen: Oranger Punkt = Anfangswert vor Start der Einnahme von DER ABSENKER. Bei 17 von 24 Testpersonen haben sich die Gesamt-Cholesterin-Werte nach 3 Monaten Einnahme von DER ABSENKER gesenkt (Senkung um mehr als 9% im Vergleich zum Ausgangswert). Bei 7 Testpersonen (Nr. 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22) zeigt sich nach 3-monatiger Anwendung keine deutliche Reduktion (Senkung der Werte weniger als 9% im Vergleich zum Ausgangswert). Nach 6 Monaten Einnahme zeigt sich eine deutliche Senkung bei 15 von 24 TeilnehmerInnen. Bei 9 Testpersonen (Nr. 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23) zeigt sich keine deutliche Reduktion der Werte nach 6 Monaten Einnahme.